

Citronnier



Nom : Citrus x limon

Famille : Rutaceae

Origine : Méditerranée

Couleur : Vert/Jaune

Taille : Entre 30 cm et 5 m

Exposition : Ensoleillée

Feuillage : Persistant

Entretenir votre Citronnier :

Le citronnier est une plante méditerranéenne qui affectionne particulièrement le plein soleil. Si vous plantez votre citronnier au sol sachez que ce dernier n'apprécie pas la présence d'herbes ou d'autres plantes qui lui font concurrence, gardez donc un périmètre vierge autour de son tronc. En pot, vous pouvez sortir votre citronnier dès l'arrivée des beaux jours vers mi-mai, d'abord dans une zone mi-ombragée puis en plein soleil. Abritez le aussi du vent qui dessèche ses feuilles.

Pour l'arrosage il est conseillé d'arroser abondamment quand la terre est sèche et d'enlever ou de vider la soucoupe pour éviter la stagnation et l'excès au niveau des racines.

Rempoter/bouturer votre Citronnier :

Le rempotage du citronnier se fait en général tous les 2 à 3 ans pour aérer la terre, augmentez la taille du pot petit à petit, 2 ou 3 cm de plus suffisent.



Maladies et parasites :

Le citronnier est sensible à différentes maladies. Particulièrement, le mal secco dans les régions à hiver froid. Le mal secco est une maladie cryptogamique causée par un champignon, la plante est blessée le plus souvent suite à une blessure. Cette maladie empêche la sève de circuler correctement et entraîne le dessèchement de la branche atteinte. La maladie se propage des extrémités de la plante au tronc, entraînant le dépérissement de celle-ci, puis sa mort. On ne peut que prévenir la maladie en coupant les parties infectées rapidement, il n'existe aucun traitement pour guérir la plante.

Parmi les parasites, l'un d'entre eux s'attaque particulièrement aux agrumes, la teigne du citronnier. C'est un insecte qui passe du stade de chenille à papillon dans un court délai, la chenille s'attaque aux fleurs et aux bourgeons, empêchant la formation de fruits. La chenille est difficile à repérer car elle se cache à l'intérieur du bouton floral. Si vous détectez une attaque de la teigne du citronnier, coupez les boutons atteints ou utilisez un insecticide efficace contre les chenilles.



Les agrumes n'échappent pas aux attaques printanières de pucerons qui conduisent à déformer les feuilles, s'enrouler les jeunes pousses et avorter les fleurs. Nous vous recommandons l'utilisation de coccinelles pour vous en débarrasser.

